



Grandes cultures

BULLETIN N° 569 DU 27 JUIN 1990 - ENVOI N° 19

MAIS : Date de traitement toutes zones.
POIS : Quelques attaques de Botrytis dans le Nord de l'ILE DE FRANCE.
Extension du vol de la tordeuse.
BETTERAVE : * Pucerons : Insecticide justifié, si plus de 100 pucerons par betterave.
POMME DE TERRE : * Mildiou : maintenez une protection soignée .

M A I S

■ PYRALE :

* Situation : Les captures de papillons sont restées faibles jusqu'à présent, mais devraient s'intensifier avec le retour du beau temps.

Les risques d'infestation sont faibles cette année car l'an dernier, beaucoup de pontes se sont desséchées, ensuite l'hiver n'a pas été favorable à une bonne survie des larves. Nous vous rappelons les secteurs à risque pyrale :

- zone allant de PONTOISE à MANTES LA JOLIE.
- Région de PROVINS.
- Zone allant de MAISSE à MONTEREAU.
- Region de MONDREVILLE.

* Préconisation : Les dates de traitement conseillées sont :

- cette semaine pour les secteurs précoces de l'ILE DE FRANCE situés au Sud de la ligne ETAMPES, MAISSE, MONTEREAU, BRAY SUR SEINE.
- Tout premiers jours de juillet : Vallée de la Seine, de la Marne, et du Morin.
- du 3 au 8 juillet : autres régions sauf VAL D'OISE.
- du 6 au 11 juillet : VAL D'OISE.

737



- 2 -
P O I S

■ **TORDEUSES**

* Situation : des captures cumulées au 25/6

NANGIS : 28	ANGERVILLE : 34
LARCHANT : 1	ABLIS : 42
BRAY SUR SEINE : 51	GOMETZ : 18
ETAMPES : 38	SONCHAMPS : 81
LIMOURS : 215	

* Préconisation : Les pois de conserve et de semence des régions d'ABLIS, SONCHAMP et de BRAY SUR SEINE devront recevoir un insecticide très vite, à condition que ces pois n'aient pas déjà atteint le stade "gousses jaunes".

■ **MALADIES :**

Quelques attaques (environ 15% des pieds) de Botrytis sur gousses sont visibles dans le Nord de l'ILE DE FRANCE pour des pois semés en terre profonde.

BETTERAVE

■ **PUCERONS :**

* Situation - Préconisation : Les parcelles ayant reçu une protection très correcte tout au long du stade sensible des betteraves à la jaunisse, n'ont plus à craindre les pucerons vis - à - vis de cette maladie. LE RISQUE JAUNISSE EST DEPASSE . Aussi, la présence très importante de colonies de pucerons dans les betteraves peut provoquer un affaiblissement des plantes.

Par conséquent, un insecticide pourra être envisagé si : toutes vos betteraves sont colonisées par plus de 100 pucerons. Si ce cas s'avère être le vôtre, utilisez de préférence un PIRIMOR G (produit efficace à des températures supérieures à 18°C). Appliquez votre spécialité le soir ou très tôt le matin.

POMME DE TERRE

■ **MILDIOU :**

* Situation - préconisation

Les pluies des derniers 15 jours ont favorisé les contaminations de mildiou. Compte tenu de l'instabilité climatique annoncée pour les prochains jours, maintenez une protection soignée de vos parcelles. Intervenez de préférence avant les pluies, avec un fongicide de contact.